



## Medikation

### Bedarfsmedikamente

Für den Patienten/die Patientin \_\_\_\_\_

wurden am \_\_\_\_\_ die folgenden Bedarfsmedikamente angeordnet.

Behandelnder Arzt/behandelnde Ärztin \_\_\_\_\_ *(Unterschrift)*

	Medikament	Darreichung	Menge	Tägliche Dosierung		Angeordnet
<b>Bei Schluckfähigkeit</b>						
<b>Schmerzen</b>	Metamizol / Novamimsulfon®	Tropfen	20 Trp. (= 500 mg)	4 mal 20	4 mal 40	
		Tabletten	500 mg	4 mal 1	4 mal 2	
	Morphin / Oramorph®	Trinkampullen	10 / 30 mg	2 / 4 / 6 mal		
	Hydromorphon / Palladon®	Tabletten	1,3 / 2,6 mg	2 / 4 / 6 mal	1,3 / 2,6	
<b>Luftnot</b>	Morphin / Oramorph®	Trinkampullen	10 / 30 mg	2 / 4 / 6 mal		
	Hydromorphon / Palladon®	Tabletten	1,3 / 2,6 mg	2 / 4 / 6 mal	1,3 / 2,6	
	Lorazepam / Tavor expidet®	Schmelztabletten	1 mg	2 mal 1	4 mal 1	
<b>Übelkeit</b>	Haloperidol / Haloperidol®	Tropfen	5 Trp. (= 0,5 mg)	3 mal 5		
<b>Fieber</b>	Metamizol / Novamimsulfon®	Tropfen	20 Trp. (= 500 mg)	4 mal 20	4 mal 40	
		Tabletten	500 mg	4 mal 1	4 mal 2	
<b>Angst/Unruhe</b>	Lorazepam / Tavor expidet®	Schmelztabletten	1 mg	2 mal 1	4 mal 1	
<b>Starke Schleimbildung</b>	Tropicamid / Mydrum Augentropfen®	Tropfen Wangenschleimhaut	5 Trp. (= 1,25 mg) 1 ml (= 5 mg)	alle 2 Stunden 5 Tropfen		
<b>Bei Schluckunfähigkeit</b>						
<b>Schmerzen</b>	Metamizol / Novamimsulfon®	Ampulle s.c.	1 g	3 mal 1	5 mal 1	
	Morphin / Oramorph®	Ampulle s.c.	10 mg	3 mal 1	6 mal 1	
	Hydromorphon / Palladon®	Ampulle s.c.	2 mg	3 mal 1	6 mal 1	
<b>Luftnot</b>	Morphin / Oramorph®	Ampulle s.c.	10 mg	3 mal 1	6 mal 1	
	Hydromorphon / Palladon®	Ampulle s.c.	2 mg	3 mal 1	6 mal 1	
	Midazolam / Midazolam®	Ampulle s.c.	5 mg	2 mal 1	4 mal 1	
<b>Übelkeit</b>	Haloperidol / Haloperidol®	Ampulle s.c.	5 mg	1 mal 1	2 mal 1	
<b>Fieber</b>	Metamizol / Novamimsulfon®	Ampulle s.c. (in 500 ml)	1 g	1 mal 3	1 mal 5	
<b>Angst/Unruhe</b>	Midazolam / Midazolam®	Ampulle s.c.	5 mg	2 mal 1	4 mal 1	
<b>Unruhe</b>	Haloperidol / Haloperidol®	Ampulle s.c.	5 mg	1 mal 1	2 mal 1	
<b>Starke Schleimbildung</b>	Butylscopolamin / Buscopan®	Ampulle s.c. (in 500 ml)	60 mg	1 mal 1	1 mal 3	
<b>Verstopfung</b>	Bisacodyl / Dulcolax®	Zäpfchen	10 mg	1 mal 1 (ab Tag 3 ohne Stuhlgang)		